

# IBS

Interactive Behavior Scale

## 부모아동 상호작용행동검사

### IBS

Interactive Behavior Scale  
Score Report

김정미

검사자	이름	SAMPLE
검사기관	성별	
검사일	2016/10/18	생활연령 05 00 (2011/09/25)

## IBS 부모 상호작용행동 검사 소개

부모아동 상호작용행동 검사(IBM: Interactive Behavior Scale)는 영·유아 및 이와 비슷한 범위의 발달을 보이는 아동을 둔 부모 또는 교사를 대상으로 일상에서 부모와 아동의 역기능적 상호작용, 또래친구나 주변사람들과의 관계 등 다른 사람과의 사회적 상호작용 유형을 관찰하고, 진단하고자 하는 검사입니다.

본 검사는 간편한 부모보고 문항 체크 방식으로 일상생활 중에 나타나는 부모와 아동 간의 상호작용 유형을 객관적으로 진단할 수 있습니다. 아동이 부모와의 상호작용에서 발달행동에 문제가 될 수 있는 요인에 노출되어 있는지를 판단하고 이를 통해 부모와 아동 간의 반응성 상호작용을 할 수 있도록 솔루션을 제시하는 데 기초자료로써 활용할 수 있습니다.

## 검사의 구성

IBS 부모아동 상호작용행동 검사는 아동에 대한 부모의 상호작용행동을 평가하는 부모 상호작용행동 검사(IBM-P: Interactive Behavior Scale for Parent)와 아동의 상호작용행동을 관찰한 후, 아동의 상호작용행동을 평가하는 아동 상호작용행동 검사(IBM-C: Interactive Behavior Scale for Child)로 구성되어 있습니다.

부모 상호작용행동 검사(IBM-P)는 총 3요인, 21문항이고, 아동 상호작용행동 검사(IBM-C)는 총 4요인, 25문항으로 각 척도 별 하위요인 구성과 문항 수는 아래 표와 같습니다.

척도	하위요인	내용	문항수
부모 상호작용행동 검사(IBM-P) (총 3요인, 21문항)	반응성	일상에서 부모가 아동의 행동을 긍정적으로 수용하고, 적합하게 반응해주는 정도를 진단	7문항
	효율성	일상에서 부모가 아동의 주의, 협력, 참여를 효과적으로 이끌어내고, 아동과 즐겁게 상호작용하는 정도를 진단	7문항
	지시성	일상에서 부모가 아동에게 먼저 무엇을 하도록 요구하거나 지시하는 정도를 진단	7문항
아동 상호작용행동 검사(IBM-C) (총 4요인, 25문항)	사회적 상호작용	아동이 다른 사람과 함께 활동을 공유하며 즐겁게 상호작용하는 정도를 진단	7문항
	주도성	아동이 주변사물을 탐색하면서 다양한 활동을 시도하고, 상대방의 주의를 끌면서 능동적으로 상호작용하는 정도를 진단	6문항
	표현성	아동이 상대방을 인식하면서 자신의 감정, 생각, 의견을 언어나 비언어적인 행동으로 표현하는 정도를 진단	6문항
	조절행동	아동이 상대방의 제안이나 요구를 수용하고, 자신의 감정과 행동을 조절하는 정도를 진단	6문항

## 검사의 활용

---

- 보다 객관적이고 간편한 방식으로 놀이상황을 비롯한 일상생활 중에 흔히 나타나는 부모와 아동의 상호작용 유형을 진단
- 부모와 아동 간에 상호작용행동을 종합적으로 이해하고 특징적인 상호작용행동을 구체적으로 파악할 수 있음
- 부모와 아동 간에 상호작용행동 평가를 통해 서로간의 구체적인 관계양상을 점검
- 부모와 아동이 반응성 상호작용을 할 수 있도록 솔루션을 제안하는 데 기초가 되는 자료로 활용

## IBS 부모아이 상호작용행동 검사의 타당도와 신뢰도

---

### ■ 타당도 검증

본 검사는 검사문항이 측정하고자 하는 상위 요인을 얼마나 잘 측정하는 문항인지를 검증하기 위해 요인분석을 통하여 검사의 요인 구조 및 검사문항의 타당도를 통계적으로 검증하였습니다.

또한 기존에 타당성을 입증받고 있는 검사인 한국판 어머니 상호작용행동평가척도(K-MBRS)와 한국판 아동 상호작용행동평가척도(K-CBRS)와의 관계성을 검토함으로써 공인타당도를 검증하였습니다(부모아동 상호작용행동 검사 전문가 지침서 참고).

### ■ 신뢰도 검증

본 검사는 신뢰도를 확인하기 위해 문항 간 내적일치도 지수인 Cronbach's  $\alpha$  계수를 산출하여 검증하였으며 부모 상호작용행동 검사(IBM-P)와 아동 상호작용행동 검사(IBM-C)의 전체 점수와 하위요인의 신뢰도 계수는 .67~.87 범위로 나타났습니다.

또한, 검사결과의 안정성(일관성)을 평가하기 위해 검사-재검사 신뢰도를 검증하였습니다(부모아동 상호작용행동 검사 전문가 지침서 참고).

## 검사의 결과 해석

---

검사결과는 각 하위요인과 검사별로 원점수, 표준점수와 백분위가 산출되고 표준점수에 따라 '높음', '보통', '낮음', '매우낮음' 네 범주로 구분됩니다.

표준점수 60점 이상은 '높음', 40~59점은 '보통', 30~39점은 '낮음', 29점 이하는 '매우 낮음'에 해당됩니다.

## 부모 상호작용행동 검사(IFS-P) 결과


부모 상호작용행동 검사의 종합수준은

입니다.

가 , 가


### 부모 상호작용행동 검사

단위: T점수



척도	하위 요인	반응성	효율성	지시성	종합점수
부모 상호작용 행동	원점수	18	21	22	52
	T점수	41	41	73	31
	백분위	20.0	21.0	99.0	3.0
	수준				

※ IBS-P 종합 점수 계산시 어머니의 지시성은 비지시성으로 역채점 되었음



## 부모 상호작용행동 검사 상세 해석

요인	수준	해석
반응성		
효율성		가 가
지시성		

## 아동 상호작용행동 검사(IFS-C) 결과


아동 상호작용행동 검사의 종합수준은

입니다.

가

### 아동 상호작용행동 검사

단위: T점수



척도	하위 요인	사회적 상호작용	주도성	표현성	조절행동	종합점수
아동 상호작용 행동	원점수	24	11	12	9	56
	T점수	48	27	20	3	15
	백분위	37.0	1.0	1.0	0.0	0.3
	수준					

※ T점수 : 평균이 50, 표준편차가 10인 표준점수로써 50점을 기준으로 이보다 위의 점수는 평균점 보다 높고, 아래의 점수는 평균점보다 낮은 것을 의미합니다.

## 아동 상호작용행동 검사 상세 해석

요인	수준	해석
----	----	----

사회적  
상호작용

가 , 가

주도성

가

표현성

조절행동

※ 수준(T점수) : 높음-60점 이상 / 보통-40~59점 / 낮음-30~39점 / 매우 낮음-29점 이하