

Korean version of ADHD Rating Scale-5

K-ARS-5

한국판 ADHD 평가척도 5판

저자: George J. DuPaul · Thomas J. Power · Arthur D. Anastopoulos · Robert Reid

한국판 표준화: 신민섭 · 김봉년 · 김재원 · 홍순범

검사기관		이름	Sample
검사일	2025/03/19	연령	10 00
작성자		휴학 경험	



검사 소개

- 한국판 ADHD 평가척도 5판(K-ARS-5)은 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)의 증상을 평가하기 위해 개발된 검사로, DSM-5 진단 기준에 근거하는 ADHD 증상의 빈도와 관련하여 부모 및 교사로부터 평가치를 얻는 것을 목적으로 합니다.
- 결과보고서에는 DSM-5 ADHD 진단 기준에 해당되는 유형별 증상에 대해 결과를 제공하고, ADHD를 가진 아동·청소년이 흔히 보이는 6가지 영역에서의 기능 손상 정도를 영역별로 제공합니다.
- K-ARS-5는 신속한 검사 실시 및 해석을 통해 ADHD의 조기 진단과 최적의 치료 제공에 기여할 수 있으며, 데이터 관리의 편의성 및 경제성으로 ADHD 관련 연구 및 임상적 활용에 유용하게 적용될 수 있습니다.

척도 구성

1. **총점 척도:** DSM-5 ADHD 진단 기준의 내용과 최대한 가깝게 기술하고, 매우 간결한 문장 구조로 작성된 문항으로 구성됩니다.

총점(ADHD)	부주의(A)와 과잉행동 충동성(H)을 포함하는 ADHD 복합형 증상을 종합적으로 평가
부주의(A)	DSM-5 ADHD 진단 기준의 부주의 유형에 해당되는 증상 평가
과잉행동 충동성(H)	DSM-5 ADHD 진단 기준의 과잉행동 충동성 유형에 해당되는 증상 평가

2. **기능 손상 척도:** ADHD 증상 척도의 각 하위 유형에 따른 기능 손상의 정도를 6개의 영역별로 평가합니다.

부모/교사 관계	부모 관계	ADHD 증상으로 인한 부모 및 가족 구성원들과의 관계에서의 어려움을 평가
	교사 관계	ADHD 증상으로 인한 교사와의 관계에서의 어려움을 평가
또래 관계		ADHD 증상에 기인된 또래 관계에서의 어려움을 평가
과제 수행 기능		ADHD 증상에 기인된 숙제를 마치거나 과제를 수행하는 데의 어려움을 평가
학업 기능		ADHD 증상에 기인된 학업 수행에서의 어려움을 평가
행동 기능		ADHD 증상으로 인한 행동 통제 및 행동 억제의 어려움을 평가
자존감		ADHD 아동·청소년의 자신에 대한 부정적인 생각과 자존감의 저하를 평가

검사 해석

- **T점수:** 원점수를 평균이 50, 표준편차가 10인 표준점수로 환산한 값이며, 50점을 기준으로 이보다 높은 점수는 평균점보다 높고, 낮은 점수는 평균점보다 낮다는 것을 의미합니다.
- **백분위:** 전체 집단을 100으로 보았을 때, 백분위 75는 수검자보다 높은 점수인 사람이 25명, 낮은 점수인 사람이 74명 있다는 것을 의미합니다.
- **수준별 기준 점수**



증상 척도 해석

Sample 피검자의 증상 척도 평가 결과,
 총점(ADHD) 수준 _____, 부주의(IA) 수준 _____,
 과잉행동-충동성(HI) 수준 _____에 해당됩니다.

증상 척도 프로파일

(단위: T점수)



	총점(ADHD)	부주의(IA)	과잉행동-충동성(HI)
원점수	19	14	5
T점수	67	71	57
백분위	96	98	77
수준			

기능 손상 척도 해석

Sample 피검자의 기능 손상 척도 평가 결과,

각 기능 손상 영역별 수준은


부모/교사 관계, 또래 관계,

과제 수행 기능 / , 학업 기능 / ,

행동 기능 / , 자존감 입니다.

기능 손상 척도 프로파일

(단위: T점수)



	부모/교사 관계	또래 관계	과제 수행 기능	학업 기능	행동 기능	자존감
원점수	1	1	3	3	3	1
T점수	50	49	70	72	73	50
백분위	51	47	98	99	99	50
수준			/	/	/	