

KISD

Korean Inventory of Sexual Deviations

성일탈검사

저자: 이수정 · 이은진

검사자	이름	SAMPLE
검사기관	성별	
검사일	2017/03/21	생활연령 23 11 (1993/03/24)


검사 타당도 척도

사회적 바람직성 척도는 사회적으로 바람직하고 모범적인 행동이기는하나 일상생활에서 수행하거나 지키기는 어려운 사항에 대해서 피검사자가 의도적으로 자신을 좋게 보이려고 긍정적인 반응을 하는 태도를 측정하고자 한다. 즉 사회적으로 바람직한 방향으로 반응하는 정도, 심리적 유연성 등을 알아보는 척도이다. 이 척도 점수가 낮은 경우는 자신의 행동이나 태도에 대해서 솔직하게 인정하는 사람으로서 자신의 단점에 대해서도 솔직하게 반응하는 경향이 있다. 이 척도 점수가 높은 경우는 다소 고의적으로 자신의 행동과 태도를 꾸며서 바람직하게 보이려는 경향이 강하다.

T점수 상 65점 이상인 경우 자신의 성향을 있는 그대로 보이기보다는 사회적으로 바람직한 방향으로 응답을 왜곡하려는 반응경향성이 높음을 의미하기에 점수 해석에 주의를 기울여야 한다.

검사 타당도 척도	원점수	T점수	백분위	수준
		M=50, SD=10		
사회적 바람직성 척도	13	40	27	

단위: T점수



해석 :

내용(임상) 척도

척도	원점수	T점수 M=50, SD=10	90% 신뢰구간	백분위	수준
성인지왜곡	22	63	61.3 ~ 64.7	91	
성적피해장애	7	66	62.2 ~ 69.8	94	
성적가해장애	9	67	62.8 ~ 71.2	96	
물품음란장애	7	62	58.5 ~ 65.5	89	
복장도착장애	6	64	60.5 ~ 67.5	92	
마찰도착장애	2	58	54.6 ~ 61.4	80	
소아성애장애	4	67	63.8 ~ 70.2	96	
관음장애	3	58	54.7 ~ 61.3	79	
노출장애	7	67	62.6 ~ 71.4	96	
음란물중독	9	67	63.4 ~ 70.6	96	

※ ' - '표시는 척도별 20% 초과 무응답으로 인해 점수 산출이 되지 않았음을 의미한다.

※ ' * '표시는 무응답이 20% 이하일 경우, 무응답 문항의 값을 해당 척도의 평균값으로 대체하여 채점된 척도이다.

결과 해석

- **T점수** | 성일탈검사의 점수는 척도 자체의 특성으로 인해 누적 백분위를 이용한 정상분포(normalized) T점수(M=50, SD=10)로 표준화한 뒤 해석된다. 어떤 척도에서 피검사자의 T점수가 50 이상이면 표준화 집단에서 평균 이상에 위치함을 의미한다.

T점수는 보통 사람들의 경우 현저하게 상승하는 사례가 드물기 때문에 임상적인 결정에 매우 유용한 정보를 제공한다. 예컨대 피검사자 중 약 95%의 T점수가 평균에서 2 표준편차만큼 떨어진 70점 이하에 위치하게 되므로, T점수가 70점 이상일 경우에는 전형적인 반응에서 상당 수준 이탈되어 있는 것으로 추정할 수 있다.

- **90% 신뢰구간** | 신뢰구간은 성일탈검사 점수의 정확성 또는 측정도구로서의 오류율을 반영한다. 즉 신뢰구간은 진점수가 놓여있는 점수의 범위를 제시함으로써 검사의 해석을 돕고, 동시에 보고된 결과가 어느 정도의 측정오차를 포함하고 있음을 말해 준다.


본 검사에서는 임상장면에서 흔히 사용되는 90% 신뢰구간을 적용하여 검사점수의 범위를 구한다. 즉 점수들 각각은 $\pm 1.65(90\text{번째 퍼센타일의 } Z\text{점수}) \times \text{표준오차}$ 정도의 오차를 가질 수 있음을 가정하여 점수의 범위를 정하고 있다.

- **백분위** | 백분위 전체 집단을 100으로 보았을 때, 한 개인의 점수가 아래에서부터 몇 번째에 해당하는가를 나타내는 수치이다. 예를 들어, 백분위 80은 전체를 100으로 했을 경우 자기보다 낮은 점수를 받은 사람이 79명, 높은 사람이 20명 있다는 뜻이다.

- **수준** | 본 검사에서는 임상장면에서 전통적으로 유의미한 차이를 가지는 것을 의미하는 **T점수 65점**을 성적 일탈의 구분 기준으로 정하였다. 성일탈 척도는 높은 수준의 성적 일탈이나 도착적인 성향을 보이는 사람들을 구별해내기 위해 고안되었기 때문에 비정상적으로 낮은 T점수를 보이는 경우에 대한 기준은 제공하지 않는다.

내용(임상) 척도 프로파일

단위: T점수



결과 해석

척도	해석
성인지 왜곡	성적인 인지 왜곡과 일탈의 수준을 평가하도록 개발되었다. 이 척도는 관음증, 노출증, 피학증과 강간 등과 연관된 통념적인 성인지 왜곡의 정도를 측정한다. 총점이 높을수록 성인지 왜곡의 수준이 높은 것으로 설명된다. T점수분포 상 65점을 넘는 경우에는 성인지 왜곡의 정도가 평균 수준 이상임을 나타내며, 왜곡된 성의식을 교정하는 인지행동프로그램에 참여가 필요한 수준이다.
성적피학 장애	자신의 신체에 상처를 내거나 굴욕감을 느끼면서 성적 흥분을 얻고, 또는 강간을 당하는 등의 상상을 통해 쾌감을 얻는 등의 특징을 포착하기 위한 것이다. 어린 시절부터 피학적인 상상이 존재하는 경향이 있지만, 피학적 행위는 성인 초기에 시작되어 만성적이고 반복적으로 나타난다. 성적 피학 장애가 성인이 된 이후 성범죄로 이어지는 경우는 많지 않지만, 장기간 지속되거나 양상이 심해해질 경우 자기자신에게 중대한 상해를 입힐 수 있다. 최소 6개월 동안, 모욕을 당하거나, 맞거나, 묶이거나 또는 다른 방식으로 고통을 당하는 행위를 포함해서 강한 성적 흥분을 유발하는 환상, 성 충동 또는 행동이 반복되었는지, 피학적 환상, 성 충동 또는 행동이 사회, 직업 또는 다른 중요한 기능영역에서 임상적으로 심각한 고통이나 손상을 초래했는지를 평가한 것이다. 척도의 T점수가 65점을 넘어선다면 차후 자신의 신체 혹은 생명에 손상을 주는 방향으로 성도착이 진행될 수 있을 것이기에 개인 상담이 꼭 필요하다고 판단된다.
성적가학 장애	가학적인 성적 환상이나 충동을 느끼고 이를 통해서 성적 흥분을 느끼며, 언어적으로 굴욕을 주는 것에서부터 감금, 고문, 성노예화, 살인에 이르는 다양한 형태로 나타난다. 성적 가학 장애에 성범죄로 이어지는 대표적인 사례는 바로 강간인데, 강간 등을 통해 피해자에게 신체적·언어적 폭력 등을 행사하거나 상해를 유발할 수 있으며, 심한 경우 살인을 저지르는 수도 있어 강력범죄와도 관련될 수 있다. 최소 6개월 동안, 타인의 심리적 또는 신체적 고통(모욕 포함)을 통해 성적 흥분감을 얻는 행위를 포함해서 강한 성적 흥분을 유발하는 환상, 성 충동 또는 행동이 반복해 왔을 수 있다. 또한 성 충동에 따라 행동해 왔거나, 성 충동이나 환상이 심각한 고통이나 대인관계의 손상을 초래하고 있는지 확인해야 할 것이다. 성적가학장애 척도의 T점수 상 65점을 넘어서는 경우, 개인 상담을 통하여 가학적인 성적 판타지의 유입경로와 그에 대한 개별화된 교정이 필요한 정도라 할 수 있다.
물품음란 장애	사람이 아닌 물건 등의 무생물을 통해 성적 흥분과 쾌감을 느끼는 것과 관련된다. 최소 6개월 이상, 무생물체의 사용하거나 성기가 아닌 신체부위에 특정한 집착을 하여, 반복되고 극심한 성적 각성, 상상, 욕구, 또는 행동을 나타내는 지를 평가한 것이다. 또한 상상, 성적 욕구 또는 행동이 임상적으로 상당히 고통스럽거나 사회적, 직업적 또는 다른 중요한 영역의 기능에 손상을 입힐 수 있다. 물품음란 장애 문항들에 대한 총점에 해당하는 T점수가 65점을 넘는 경우, 집단 인지행동 치료프로그램들에 참여하여 자신의 문제행동을 스스로 인식하는 노력이 필요하다.
복장도착 장애	성범죄와의 연관성은 적은 편이지만 피해자의 옷을 절취하여 입을 경우 다른 범죄(예를 들자면 절도 혹은 풍기문란 등)를 저지르는 원인이 될 수 있다. 최소 6개월 이상, 복장도착의 지속적이고 강렬한 성적 각성과 환상, 욕구 또는 행동을 나타내거나 성적 상상, 성적 욕구 또는 행동이 고통스럽거나 사회적, 직업적 또는 다른 중요한 영역의 기능에 손상을 입히는 지를 평가한 것이다. T점수가 65점이 넘는 경우 복장도착 장애와 관련된 행동적인 습벽을 수정하는 집단행동치료 프로그램이 권유되어야 한다.
마찰도착 장애	동의하지 않은 상대에게 다가가 몸을 접촉하고 성기 등을 문지르는 행위에 대해 성적 흥분을 느끼거나, 상대방에게 강압적으로 행동하는 것이 아니라 문지르는 행위 자체에 대한 강한 충동을 느끼는 것이 특징이다. 공공장소에서 동의하지 않은 피해자에게 신체를 접촉함으로써 성적 수치심을 유발하기 때문에 성추행이나 심각한 성범죄로 이어질 수 있다. 이 척도의 점수가 65점을 넘으면 행동치료를 통하여 꼭 마찰도착 장애에 대한 욕구를 해결해야 할 것이다.

결과 해석

척도	해석
소아성애 장애	아이들과의 성행위를 통해서 성적 흥분을 얻는 경우이며, 소아 성범죄로 이어질 수 있다. 최소 6개월 동안, 사춘기 이전의 아동이나 아동들(보통 만 13세 이하)과의 성행위를 포함해서 강한 성적 흥분을 유발하는 환상, 성충동 또는 행동이 반복되거나 소아성애와 관련된 성 충동에 따라 행동해 왔거나, 성 충동 또는 환상이 현저한 고통이나 대인 관계의 어려움을 초래해 왔다. T점수가 65점을 넘어서면 소아성애 경향을 교정하기 위한 개인상담 및 집단행동치료가 반드시 필요하다.
관음 장애	이성이 옷을 벗고 있거나 벗고 있는 과정, 또는 성행위를 하는 모습을 피해자가 전혀 알지 못하게 몰래 훑쳐보는 것이 대표적인 행동이다. 피해자를 엿보기 위한 것이지 성행동을 하려는 것은 아니며, 피해자의 신체에 직접적으로 피해를 입히지는 않지만 성적 수치심이나 두려움 등의 정신적 피해를 야기할 수 있다. 최소 6개월 동안 반복적으로 알몸인 사람 또는 성 행위를 하는 사람을 관찰하며 자신의 판타지, 욕구, 행위로써 강한 성적 흥분을 느껴왔거나 성적 욕구를 동의할 받지 않은 사람에게 행하였거나 성적욕구나 환상들이 임상적으로 다른 중요한 영역의 기능에서나 심한 고통이나 사회적, 직업의 손상을 야기할 수 있다. T점수가 65점을 넘어서면 관음장애에 대한 문제의식을 꼭 가져야 하며, 인지행동치료가 제공되어야 한다.
노출 장애	노출 장애는 자신의 성적인 기관을 공공장소에서 노출하여 성적 흥분을 느끼는 성도착의 한 종류로서, 타인이 자신의 성기를 보고 깜짝 놀라는 것에서 극도의 흥분을 느끼는 것이다. 낯선 사람에게 성기를 노출시키는 행위를 포함한 강한 성적흥분을 일으키는 환상, 성충동 또는 행동을 반복하고, 관련된 환상, 성 충동 또는 행동이 사회, 직업 또는 다른 중요한 기능영역에서 임상적으로 심각한 고통이나 손상을 초래할 수 있다. T점수가 65점 이상이면 문제행동에 대한 행동치료가 제공될 필요가 있다.
음란물 중독	성도착 증상을 물어보는 문항들 이외에 음란물 중독 장애에 관한 척도는 추가로 포함되었다. 음란물 중독은 성범죄와 높은 상관관계를 지니며 청소년이나 성인들이 자극적이고 비인격적인 내용을 포함하는 음란물 중독을 거쳐 성도착으로 진행되는 경우가 많기 때문이다. T점수가 65점을 넘는다면 음란물에 대한 노출이 많고 중독으로 진행된 것으로 볼 수 있다. 도착에 이르지 않도록 부정적인 습관이나 잘못된 태도를 수정하기 위한 인지행동치료가 필요할 수 있다.

KISD 문제문항

아래에 제시된 문항은 해당문항에 '②가끔 그렇다', 또는 '③자주 그렇다' 또는 '④항상 그렇다' 로 응답한 문항이다.

문항번호	문항	응답
2	.	
3	가 .	가
4	.	
5	, 가 .	가
7	가가 .	가
8	.	
9	.	
10	.	가
11	.	
12	.	
14	가 .	
15	가 가 .	가
17	.	가
18	가 , .	
19	가 가 가 , .	
20	가 가 , .	
21	가 , " " .	
24	.	
25	가가 .	가
26	, .	
29	가 .	가
32	.	
33	가 .	가
34	가 .	
36	.	
39	.	가
44	가 .	
45	.	
48	.	
49	.	가
52	가 .	가
55	가 , .	
56	.	가
57	.	

KISD 문제문항

아래에 제시된 문항은 해당문항에 '②가끔 그렇다', 또는 '③자주 그렇다' 또는 '④항상 그렇다' 로 응답한 문항이다.

문항번호	문항	응답
61	(, ,)	가
68	.	
70	()가	
72	.	
73	.	가
81	.	가
86	.	가
91	.	
92	가	가
98	.	
99	().	가
106	.	
107	.	가
110	.	
112	.	
113	가 ,	가
114	.	
115	.	
117	.	
118	.	가

KISD 성일탈검사 소개

KISD 성일탈검사는 다양한 성적 일탈, 그 중에서도 DSM-5에 명기된 대표적인 성도착(paraphilia) 유형에 대한 평가와 함께 성범죄의 재범요인으로서 가장 중요하게 언급되는 성인지 왜곡과 음란물 중독 여부를 판단하기 위한 감별도구로서 개발되었다. 따라서 이 검사는 성적인 일탈을 보이는 임상(법정)집단을 대상으로 사용하는 것을 일차적인 검사 목적으로 한다. 물론 일반인을 대상으로 하여 성인지 왜곡의 정도와 음란물 중독의 여부를 측정하는 것도 가능하다고는 판단되나, 성도착 하위척도들의 경우 일반인들을 대상으로 하여서는 별다른 감별기능을 발휘하기는 어려울 것이다. 이는 본 검사에서 개발된 성도착의 문항들이 단순한 성적 상상의 정도를 넘어 구체적인 성도착 행위를 평가하고 있기 때문이다.

KISD 성일탈검사의 구성

척도	문항수	척도	문항수
사회적 바람직성 척도	12	마찰도착장애	10
성인지왜곡	20	소아성애장애	10
성적피해장애	10	관음장애	10
성적가학장애	10	노출장애	10
물품음란장애	10	음란물중독	10
복장도착장애	10	총 문항수	122

KISD 성일탈검사 활용

성일탈검사는 일종의 감별도구이다. 따라서 형사사법기관의 판결 전 단계나 교정단계에서 의뢰된 성인들을 대상으로 사용할 것을 권고한다. 또한 성일탈 행위를 저질러 정신과나 상담기관에 의뢰된 성인 환자들을 대상으로 하여서도 사용이 가능하다.

청소년의 경우에도 이 검사도구는 진단적 도구로서 사용이 가능하다. 학교나 상담소, 혹은 소아청소년 정신과 등에서 성적인 일탈이 의심되어 의뢰되는 경우 이 검사를 사용할 수 있다. 성인 기준 뿐 아니라 청소년 기준도 제공하고 있어 만 20세 미만의 청소년에게도 이 검사를 사용할 수 있다.

기준표는 일단 남녀를 합하여 개발되었다. 따라서 여성을 대상으로 하여 독자적으로 개발된 기준표는 존재하지 않는다. 성도착의 유병률이 남성에게 더 많다는 사실을 고려해 볼 때 여성을 대상으로 한 검사 결과는 과소평가될 위험성이 있으므로 점수의 해석에 신중을 기하는 것이 좋겠다.