

# K-TABS

Korean - Temperament and Atypical Behavior Scale

## 한국판 영유아 기질 및 비전형 행동 척도

### K-TABS

Korean - Temperament and Atypical Behavior Scale  
Score Report

김정미

검사자	TEST3	이름	sample
검사기관	인사이트	성별	남
검사일	2025/03/19	생년월일	만 03세00개월(2022/03/01)

## 소개

본 검사는 만 6세 이하(12개월 이상)의 영유아 또는 이와 비슷한 범위의 발달을 보이는 아동의 비전형적 발달 및 비전형적 발달 위험성이 있는 아동을 사전 선별하는 목적으로 개발된 검사입니다. 검사는 임상적 목적으로 사용될 수 있으며, 비전형적인 발달 위험성이 있는 아동을 위한 조기중재 프로그램을 계획하는데 기초 자료로 이용될 수 있습니다.

본 검사는 총 50문항의 5개 하위요인(고립행동 요인, 과민감성 요인, 과활동성 요인, 저반응성 요인, 조절행동 요인)으로 구성되어있으며 검사결과는 5개 하위요인의 총점으로 이루어진 기질 및 조절지표(TRI점수)와 각 5개 하위요인 별 점수 및 해석을 제공해 줍니다.

검사요인	문항수	측정내용
고립행동	18문항	위축되고 상황과 동떨어지며 자기 생각에 몰두해 있고, 몰입하기 어렵거나 일상의 일과와 연계가 잘 안 되는 행동
과민감성	9문항	아주 작은 환경적 자극에 대해 과도하게 민감하며 예민한 반응을 나타내는 행동
과활동성	8문항	과도하게 반응적, 충동적, 활동적이며, 부정적이고 도전적인 행동
저반응성	10문항	반응이 거의 없거나 하나의 반응을 유도하기 위해서 강력한 환경적 자극이 필요하며, 각성수준이 제한적이고 낮은 예민함, 수동성, 무기력함
조절행동	5문항	신경생리적인 행동과 소리-운동 조절을 조절하거나 통제하는 것에 대한 어려움
TRI 전체점수	50문항	기질 및 조절에 관한 5개 하위요인의 총점

## 검사 해석시 유의 사항

▶ 본 검사의 결과는 아동발달을 돕기 위한 자료이며, 아동을 이해하기 위해서는 다양한 검사를 실시하고 종합적인 해석을 요합니다.

따라서 본 검사 하나의 결과로 아동의 현재 발달상태를 단정하지 마시고, 결과해석에 신중을 기해 주시기 바랍니다.

· 원점수 : 아동이 획득한 점수

· 백분위 : 백분위 점수는 아동이 획득한 점수를 전체아동 사례에 대한 비율로 나타낸 수치

## 결과해석

요인	고립행동	과민감성	과활동성	저반응성	조절행동	TRI 전체점수(TRI 지표)
원점수	13	6	6	7	4	36
백분율	99.9	87.4	98.4	99.9	98.9	99.9
T점수	108	67	83	184	89	107
수준	비전형	잠재위험	비전형	비전형	비전형	비전형

## 문제항목

검사요인	문항	응답
고립행동	1. 현재 일어나는 상황과 맞지 않는 정서 상태를 보인다. (예: 박스치고 즐거운 상황에서 찡그리고 우는 행동 등)	예
고립행동	3. 상대의 눈을 똑바로 쳐다보려고 하지 않는다.	예-도움필요
고립행동	5. 스스로 다른 사람과 놀이를 시작하기가 어렵다.	예
고립행동	7. '자기 세상'안에 갇혀 있는 것 같다.	예-도움필요
고립행동	8. 종종 허공을 응시한다.	예
고립행동	11. 어떻게 가지고 노는지 잘 모르는 것처럼 장난감을 가지고 논다.	예
고립행동	13. 너무 많은 조명, 소음, 접촉이 주어지면 불안해한다.	예-도움필요
고립행동	16. 특정 장난감이나 물체에 대해 과도하게 관심을 갖는다.	예
고립행동	18. 반복적으로 머리를 흔들다.	예-도움필요
과민감성	20. 아주 사소한 일에도 불안해한다.	예
과민감성	22. 기분의 변화폭이 크다.	예-도움필요
과민감성	25. 격렬한 분노(예: 심한 떼쓰기 등)를 보인다.	예
과민감성	26. 종종 짜증을 내거나 과민하거나 신경질적이다.	예-도움필요
과민감성	30. 자주 질투심을 나타낸다.	예-도움필요
과활동성	28. 계속해서 주의집중을 하라고 요청해야 한다.	예
과활동성	32. 가만히 앉아있지 못한다.	예
과활동성	34. 고의로 물건을 던지거나 부순다.	예-도움필요
저반응성	37. 어떤 소리나 보여지는 장면에 주의를 기울이지 않는다.	예
저반응성	38. 움직이는 물체에 관심이 없는 듯하다(쳐다보지 않는다).	예-도움필요
저반응성	40. 자기 이름에 반응하지 않는다.	예
저반응성	42. 엄마(또는 다른 양육자)와 노는 것을 즐기지 않는다.	예-도움필요
저반응성	44. 웅얼거리거나 말하려는 시도가 거의 없다.	예
조절행동	46. 잠잘 때 악몽을 꾸어 놀라는 경우가 자주 있다.	예-도움필요

## 문제항목

검사요인	문항	응답
조절행동	48. 자주 잠에서 깨고, 깬 후에 다시 잠들기 어려운 경우가 많다.	예
조절행동	50. 잠에 들려면 매번 재워주어야 한다.	예

## 상세 해석

검사요인	결과	해석
TRI 전체점수	비전형	전반적으로 아동이 현재 가지고 있는 기질적 성향과 일상에서 관찰되는 행동들이 사회적 기대에 비해 일상적이지 않으며 때때로 극단적인 행동패턴과 자기조절 행동으로 특징지어질 수 있습니다. 심한 경우는 비전형적인 발달과 신경행동적 특징에 대한 공식적인 진단을 받을 수 있습니다. 환경 내에서 아동의 전반적인 상호작용이 항상 부정적이고 성공적이지 못할 때, 일반적인 행동장애가 초래될 수 있습니다. 만일 발달검사결과, 아동의 발달수준이 경계선 또는 지연 발달 범주로 진단되었다면, 아동의 현재 관찰되는 행동특성은 비전형의 범주로 의심되며, 전문가 상담을 통해 적합한 서비스를 제공하고 주기적인 관찰이 필요합니다.
고립행동	비전형	아동의 고립행동 성향은 기질적으로 사회적 기대에서 요구하는 상황과 동떨어지며, 자기 생각에 몰두해 있거나 다른 어른 또는 또래 아동들이 포함되어 있는 일상적인 일과와 연계가 잘 안 되는 행동을 나타낼 수 있습니다. 예컨대 아동은 사람을 똑바로 보기보다는 스쳐 지나가고, 멍하여 초점이 명확하지 않거나 허공을 응시하고 때로는 아무도 주변에 없는 것처럼 행동하기도 합니다. 만일 아동의 현재 발달수준이 지연발달 범주로 진단되었다면 관찰되는 아동의 행동은 전반적으로 부모 또는 다른 어른들과 함께 하는데 관심이 없고 또래 아동과 잘 어울리지 못하는 특성을 가진 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 행동특성이 일상에서 자주 발견된다면 현재 아동은 사회적 상호작용에 문제가 의심됩니다.
과민감성	잠재위험	아동의 과민감 성향은 일상에서 어떤 자극에 대해 다소 과도하게 반응하거나 기질적으로 불안정한 정서 표현을 나타내기도 합니다. 또한 어떤 자극에 대해서는 자기만의 선호가 뚜렷이 나타나기도 합니다. 아동은 다소 기질적으로 예민한 편이거나 또는 어떤 자극에 대한 자기만의 선호가 강하여 집착으로 보이기도 합니다. 따라서 부모 (또는 교사)는 일상에서 아동의 행동에 대해 보다 세심한 관찰이 요구됩니다.
과활동성	비전형	아동의 과활동 성향은 아주 작은 환경적 자극에도 과격한 반응을 보이거나 충동적이고 때로는 공격성과 부정적인 행동을 나타내기도 합니다. 예컨대, 하나에 집중하지 못하고 욕심을 내어 과도하게 이것저것을 하려 하거나 극도의 심한 떼쓰기, 충동적이고 공격적인 행동, 불안, 초조해 하는 행동을 나타내기도 합니다. 이러한 행동이 아동의 일상생활에서 다양한 활동으로 명확히 드러난다면 아동의 기질적인 충동성 및 과잉행동 문제가 의심됩니다.
저반응성	비전형	아동의 저반응 성향은 또래 집단과 비교할 때, 반응이 거의 없거나, 하나의 반응을 유도하기 위해서는 강력한 환경적 자극이 필요하기도 합니다. 각성수준에 한계가 있고 자극에 반응하기까지는 높은 강도의 자극이 필요하고 스스로 반응하기 보다는 수동적이며 때로는 무기력함을 나타냅니다. 예컨대, 아동은 새로운 사건에도 놀라지 않거나 좋아하는 장난감을 뺏겨도 화내지 않으며 소리에 반응하지 않고 재미있는 일에도 미소 짓거나 소리 내서 웃지 않는 것이 빈번히 관찰됩니다. 이는 참여를 회피하는 고립행동과는 다른 양상으로 나타납니다. 만일 아동이 신경손상에 의한 생리적 원인이 아닌 상황에서, 이와 같은 특성이 일상에서 자주 관찰된다면 아동의 기질적인 문제가 의심됩니다.
조절행동	비전형	아동의 조절행동은 자기통제에 빈번한 실패를 나타내며, 신경 생리적인 행동(수면, 울기, 스스로 편안해지기 등)과 감각적 자극에 대해 과도한 집착을 나타내기도 합니다. 예컨대, 어린 영아들의 경우 너무 오래 울거나 잠들려면 오랫동안 부모의 도움이 필요하거나 잠자다가 소리를 지르는 행동으로 달래기가 어려운 문제 등을 보일 수 있고, 유아들의 경우에는 또래집단 생활에서 부적응적인 행동으로 적응에 어려움을 나타내기도 합니다. 이와 같은 행동이 일상에서 빈번히 관찰되면 기질적인 자기조절의 문제가 의심됩니다.

---

## [ 검사자 종합 소견 및 제언 ]

---

※ 종합 소견 및 제언 내용은 검사결과에 따른 검사자의 개인 소견으로서 인사이트에서 제공하는 의견이 아닙니다.

---