

PAI-A 증보판

단축형

Personality Assessment Inventory Adolescents

PAI-A 성격평가 질문지

저자: Leslie C. Morey, Ph. D

한국판 표준화 : 황순택 · 김영환 · 권해수 · 김지혜 · 박은영 · 박종규 · 오상우 · 이수정 · 이은호 · 조은경 · 홍상항

검사자 _____

수검자명 SAMPLE _____

검사기관 _____

성별 여 _____

검사일 2019/05/28 _____

생활연령 만17세00개월 (2002/05/22) _____

소속/학교 고등 _____

학년 1년 1학기 _____


참고사항;

타당성 지표 결과

구분	척도	기준	해석	T점수	척도	기준	해석	T점수
타당성 척도	비일관성 ICN	0-68	일관성 있는 반응	83	부정적 인상 NIM	0-64	정상	59
		69-77	비일관적			65-74	부정적 인상 또는 도움요청	
		78 이상	매우 비일관적			75 이상	부정적 인상 또는 정신병리 의심	
	저빈도 INF	0-65	정상	134	긍정적 인상 PIM	0-45	정상 또는 도움요청	35
		66-78	무선반응 의심			46-63	정상	
		79 이상	무선반응			64-71	긍정적 인상 의심 또는 방어적 반응	
						72 이상	긍정적 인상	

전체척도 프로파일

단위 : T점수



ICN (비일관성, Inconsistency)

PIM (긍정적 인상, Positive Impression)

ARD (불안관련 장애, Anxiety-Related Disorder)

PAR (망상, Paranoia)

ANT (반사회적 특징, Antisocial Feature)

AGG (공격성, Aggression)

NON (비지지, Nonsupport)

WRM (온정성, Warmth)

INF (저빈도, Infrequency)

SOM (신체적 호소, Somatic Complaints)

DEP (우울, Depression)

SCZ (조현병, Schizophrenia)

ALC (알코올문제, Alcohol Problems)

SUI (자살관념, Suicide Ideation)

RXR (치료거부, Treatment Rejection)

NIM (부정적 인상, Negative Impression)

ANX (불안, Anxiety)

MAN (조증, Mania)

BOR (경계선적 특징, Borderline Features)

DRG (약물문제, Drug Problems)

STR (스트레스, Stress)

DOM (지배성, Dominance)

문항 누락

Missing Items 0

수검자가 응답하지 않았거나 이중으로 응답한 문항의 개수입니다. 이러한 문항이 7개 이상일 경우 해석을 보류하고 문항에 대한 반응을 확인하거나 검토할 필요가 있습니다.


결과해석

척도	척도명	T점수	백분위	수준	해석
ICN	비일관성	83	99.7	매우 높음	검사 문항에 대해 주의를 기울이지 않고 매우 비일관성 있게 반응하였습니다. 이 경우 검사결과를 타당하게 해석하기 어렵습니다. 주의력과 집중력이 부족하며 정신적으로 혼란스러울 수 있고, 무성의하게 응답하였을 수 있습니다. 수검태도를 측정하는 다른 보충지표의 점수를 같이 고려해야하고 PAI-A에 대한 임상해석은 하지 않는 것이 바람직합니다.
INF	저빈도	134	100.0	매우 높음	문항내용에 대해 적절하게 반응하지 못했다고 볼 수 있습니다. 독해력 문제, 무선 반응, 정신적 혼동, 채점오류 등과 같은 원인이 있을 수 있으나, 원인이 어디에 있든지 간에 검사결과는 타당하지 않다고 보아야 하고 어떤 임상적 해석도 시도하기 어렵습니다. 이러한 경우 수검자에게 저빈도척도 전체 문항에 대해 다시 물어볼 필요가 있습니다.
NIM	부정적 인상	59	86.5	중간 범위	임상척도에서 부정적인 방향으로 왜곡했을 가능성이 거의 없다고 보여지며, 실제적인 임상 양상보다 더 부정적인 인상형성을 시도하지 않았다고 볼 수 있습니다.
PIM	긍정적 인상	35	10.3	낮음	검사 문항을 읽으면서 매우 솔직하게 반응했다고 할 수 있습니다. 이 척도의 점수가 지나치게 낮고, NIM 척도가 높음 이상일 경우 수검자가 도움을 요청하고 있거나 임상적 문제에 노출되어 있을 가능성이 높습니다.
SOM	신체적 호소	68	95.0	중간 범위	건강에 대해 어느 정도 관심을 가지고 있다는 것을 시사하지만 노인이나 특정한 신체적 질병이 있는 환자들의 경우도 흔히 이 정도의 점수가 나타날 수 있습니다.
ANX	불안	64	91.1	중간 범위	스트레스를 경험하고 있을 가능성이 있고 걱정이 많고 예민하며 감정적일 수 있습니다. 어느 정도의 스트레스를 경험하고 있고 민감하고 정서적으로 불안정하여 감정적으로 반응할 수 있습니다.
ARD	불안관련 장애	61	86.8	중간 범위	가끔 또는 경미한 정도의 불안을 경험하고 불안감을 통제하기 위해서 부적응적인 행동이 나타날 수 있습니다. 또한 특정 대상에 대해 공포나 염려를 경험하고 자신감이 부족할 수 있습니다.
DEP	우울	68	93.9	중간 범위	스스로를 불행하다고 느끼고, 민감하고 비관적이며 자신을 신뢰하지 못한다는 것을 시사합니다.
MAN	조증	70	96.8	높음	안절부절못하고 충동적이며 에너지 수준이 높은 사람이라고 보입니다. 이러한 사람들 중에는 동정심이 없고 성미가 급한 불 같은 성질의 사람으로 보일 수도 있습니다.
PAR	망상	65	93.5	중간 범위	다소 예민하고, 민감하며 완고하고 성격이 거친 회의적인 사람처럼 보일 수 있습니다. T점수가 70점에 근접할수록 대인관계에서 지나치게 조심하고 경계하며 주의하는 경향이 증가할 수 있습니다.
SCZ	조현병	75	98.2	높음	사람들로부터 고립되고 다른 사람들이 자신을 이해해주지 못한다고 생각하며 소외감을 느낄 가능성이 높습니다. 사고과정이나 사고내용, 집중력, 의사결정에 관한 많은 문제를 가지고 있을 수 있습니다. 이들이 경험하는 정신병적인 특이한 지각이나 신념을 밝히기 위해서는 피검자의 응답을 검토해야 합니다.

결과해석

척도	척도명	T점수	백분위	수준	해석
BOR	경계선적 특징	56	76.8	낮음	정서적으로 안정되어 있고 안정적인 대인관계를 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
ANT	반사회적 특징	91	99.5	매우 높음	반사회적 성격장애의 특징들이 나타날 수 있습니다. 신뢰롭지 못하고 책임감이 없을 가능성이 높으며, 대인관계에서는 냉담하고 현실적 이득을 추구하며 욕구 충족을 위해 다른 사람을 이용할 가능성도 높습니다. 충동적으로 현실적인 충고를 추구하거나 권위적 인물과 갈등을 경험한 적이 있을 수 있습니다.
ALC	알코올문제	99	99.6	매우 높음	전형적인 심각한 알코올 의존과 관련있어, 반복적으로 금주를 시도하지만 음주를 중단하는데 어려움을 겪을 수 있습니다. 가끔 음주에 대해 죄책감을 느끼면서도 음주가 자기 생활에 미치는 영향을 거의 통제하기 어려울 수 있습니다. 술에 취한 상태에서 일시적인 의식상실(blackout)이나 알코올에 대한 생리적 의존 및 금단증상이 나타날 수 있습니다.
DRG	약물문제	152	100.0	매우 높음	전형적으로 심각한 약물의존과 관련이 있어, 약물사용을 중단하려고 반복해서 시도하지만 약물사용을 중단할 수 없고 약물이 생활에 미치는 영향을 거의 통제할 능력이 없을 수 있습니다. 이 경우 보통 물질에 대한 심리적, 생리적 의존의 징후와 금단증상이 나타날 수 있습니다.
AGG	공격성	80	98.4	매우 높음	상당한 분노를 가지고 있고 공격적, 폭력적 행동을 할 가능성이 높으므로 주의가 필요합니다. 공격성과 폭력을 측정하는 보충지표의 점수를 같이 고려할 필요가 있으며, 공격행동은 임상양상에서 중요한 역할을 하고 치료를 복잡하게 만드는 잠재적 요인이므로 치료계획을 수립할 때 주의를 기울여야 합니다.
SUI	자살관념	70	95.0	높음	반복적인 자살사고를 시사하고 있으며, 이 경우 자살할 가능성에 관한 중요한 신호로 고려해야 합니다. 이 정도의 점수 상승은 자살에 대한 상당한 양가감정이 있을 수 있기 때문에 부가적인 위험요인에 대해서도 관심을 기울여야 합니다. 이 점수대에 있는 사람들의 경우 환경과 가용할 수 있는 지지체계를 평가하는 것이 매우 중요합니다.
STR	스트레스	69	94.1	중간 범위	생활에 관한 주요 영역에서 다소 어려움을 겪고 있고 중간 정도의 스트레스를 경험할 수 있습니다.
NON	비지지	60	86.3	중간 범위	지지적인 친밀한 관계를 맺지 못하고 있거나 친밀한 대인관계가 적고, 가족 및 친구와의 관계에 대한 불만이 있다는 것을 지적하는 것으로 볼 수 있습니다.
RXR	치료거부	42	28.0	낮음	자신의 문제에 대해 적절히 인식하고 있고 변화 동기가 높은 편입니다. 이 척도의 점수가 낮을수록 심리적 문제나 불편감이 있을 수 있으므로 NIM 척도와 임상 척도 점수를 같이 고려해서 해석하는 것이 바람직합니다.
DOM	지배성	63	91.7	높음	사회적 상황에서 거의 불편을 느끼지 않고 자신이 통제할 수 있는 상황에서 다른 사람과의 상호작용을 선호합니다. 자기 스스로에게 만족감을 느끼고 자신감이 있으며, 타인을 설득하는 능력이 있습니다.
WRM	온정성	61	90.9	높음	대인관계 상황에서 다른 사람에게 다정하고 온정적이며, 지지적인 편입니다. 때로는 사람을 쉽게 믿거나 타인의 잘못을 쉽게 용서하기도 합니다.

PAI-A의 기본적 해석전략



PAI-A 척도

척도		내용
타당성 척도	비일관성 (ICN)	수검자가 문항을 읽고 답하는 과정에서 일관성있게 반응하였는지를 알아보기 위해 정적 또는 부적 상관관이 높은 10개의 문항 쌍으로 구성
	저빈도 (INF)	부주의하거나 무선적인 또는 매우 특이한 방식으로 반응하였는지를 알아보기 위한 척도. 문항 내용은 정신병적인 측면에서 중립적이고 대부분의 사람들이 극단적으로 인정하거나 인정하지 않는 문항들로 구성되어 있음
	부정적 인상 (NIM)	지나치게 나쁜 인상을 주거나 피병을 부리는 태도
	긍정적 인상 (PIM)	자신을 지나치게 좋게 보이려 하고 사소한 결점도 부인하려는 태도
임상 척도	신체적 호소 (SOM)	신체화장애, 전환장애와 관련이 있는 건강과 관련된 문제에 대한 집착과 신체적 불편감에 대한 호소
	불안 (ANX)	여러 가지 반응양식으로 나타나는 불안 경험과 불안의 객관적 징후
	불안관련 장애 (ARD)	강박장애, 공포증, 외상적 스트레스와 같은 구체적인 불안과 관련이 있는 증상과 행동
	우울 (DEP)	우울의 증상과 현상
	조증 (MAN)	조증과 경조증의 정서적, 인지적, 행동적 증상
	망상 (PAR)	망상장애와 망상적 성격장애의 증상
	조현병 (SCZ)	조현병에서 나타나는 광범위한 증상
	경계선적 특징 (BOR)	불안정하고 유동적인 대인관계, 충동성, 정서적 가변성과 불안정성, 통제할 수 없는 분노 등을 포함하는 경계선 성격장애의 특징
	반사회적 특징 (ANT)	범죄행위, 권위적 인물과의 갈등, 자기중심성, 공감과 성실성의 부족, 불안정, 감각추구 등과 같은 반사회적 성격장애의 특징
	알코올문제 (ALC)	문제시되는 음주와 알코올 의존적 특징
	약물문제 (DRG)	약물사용에 따른 문제와 약물의존적 특징
	공격성 (AGG)	분노, 적대감 및 공격성과 관련된 특징과 태도
치료 고려 척도	자살관념 (SUI)	무력감과 자살에 대한 일반적이고 모호한 생각과 자살에 관한 구체적인 계획
	스트레스 (STR)	일상생활에서 현재 또는 최근에 경험하는 스트레스
	비지지 (NON)	가용한 지지의 수준과 질을 포함하는 지각된 사회적 지지의 부족
	치료거부 (RXR)	심리적, 정서적 측면에서 자신의 문제에 대한 인식과 변화에 대한 동기
대인 관계 척도	지배성 (DOM)	대인관계에서 개인적 통제와 독립성을 유지하는 정도를 평가
	온정성 (WRM)	대인관계에서 지지적이고 공감적인 정도를 평가