

PAI-A-PS

단축

Personality Assessment Inventory for Adolescents – Probation Settings

보호관찰소용 성격평가 질문지

저자: Leslie C. Morey, Ph. D

한국판 표준화: 박은영 · 이수정 · 권해수 · 김영환 · 김지혜 · 박종규 · 오상우 · 이은호 · 조은경 · 황순택 · 홍상환

검사자		수검자명	SAMPLE
검사기관		성별	여
검사일	2019/11/25	만 나이	만14세00개월 (2005/11/16)
소속/학교	중등	학년	3년 1학기
재범 유무	초범	본 건 범죄 유형	폭력사범
재범 응답 시 보호관찰 횟수		본 건 범죄명	폭행

타당성지표 결과

구분	척도	기준	해석	T점수
타당성 척도	비일관성 ICN	0-68	일관성 있는 반응	69
		69-77	비일관적	
		78 이상	매우 비일관적	
	저반도 INF	0-65	정상	46
		66-78	무선반응 의심	
		79 이상	무선반응	
	부정적 인상 NIM	0-64	정상	66
		65-74	부정적 인상 또는 도움요청	
		75 이상	부정적 인상 또는 정신병리 의심	
	긍정적 인상 PIM	0-45	정상 또는 도움요청	62
		46-63	정상	
		64-71	긍정적 인상 의심 또는 방어적 반응	
		72 이상	긍정적 인상	

문항 누락


Missing Items 0

수검자가 응답하지 않았거나 이종으로 응답한 문항의 개수입니다. 이러한 문항이 7개 이상일 경우 해석을 보류하고 문항에 대한 반응을 확인하거나 검토할 필요가 있습니다.

※ 타당도 지표의 해석

검사대상자가 어떠한 목적에서 자기자신을 잘 적응하거나 적응하지 못하는 사람 또는 매우 바람직하거나 바람직하지 못한 사람처럼 위장하고; 자기자신에 대한 인식이나 통찰력이 부족하거나 자기기만하고; 정신적 혼란이나 부주의 또는 검사에 대한 무관심 때문에 검사결과가 왜곡될 수 있습니다. 따라서 이러한 경향을 찾아내기 위해 PAI의 4가지 타당성 척도 점수를 살펴보아야 합니다. 4가지 타당성 척도가 기준에서 벗어날 경우 검사대상자의 반응양식에 의해 검사결과가 왜곡되었을 가능성이 높습니다. 4가지 타당도 척도 중 하나의 결과가 상승하였을 때도 전반적인 타당도 척도의 변화를 고려하여 해석하는 것이 바람직합니다. 따라서 타당도 척도가 기준보다 상위점수일 경우, 프로파일을 해석하는데 많은 제한이 있으므로 다른 정보들을 통합해서 해석하는 것이 바람직합니다.

전체척도 프로파일



ICN (비일관성, Inconsistency)

PIM (긍정적 인상, Positive Impression)

ARD (불안관련 장애, Anxiety-Related Disorder)

PAR (망상, Paranoia)

ANT (반사회적 특징, Antisocial Feature)

AGG (공격성, Aggression)

NON (비지지, Nonsupport)

WRM (온정성, Warmth)

INF (저빈도, Infrequency)

SOM (신체적 호소, Somatic Complaints)

DEP (우울, Depression)

SCZ (조현병, Schizophrenia)

ALC (알코올문제, Alcohol Problems)

SUI (자살관념, Suicide Ideation)

RXR (치료거부, Treatment Rejection)

NIM (부정적 인상, Negative Impression)

ANX (불안, Anxiety)

MAN (조증, Mania)

BOR (경계선적 특징, Borderline Features)

DRG (약물문제, Drug Problems)

STR (스트레스, Stress)

DOM (지배성, Dominance)

전체척도 프로파일 결과

결과해석

척도	척도명	일반 청소년 기준 적용		보호관찰대상자 기준 적용		일반적 해석
		T점수	백분위	T점수	백분위	
ICN	비일관성	69	97	68	96.5	유사한 문항쌍에 대해 일관되게 반응하는 정도가 낮습니다. 이 경우 검사에 대한 동기와 검사에 대한 이해 부족, 부주의나 정신적 혼란 등과 같은 원인이 작용했을 수 있으므로 다른 척도 점수를 해석할 때 유의해야 합니다.
INF	저빈도	46	78	45	71.6	문항을 읽으면서 적절한 주의를 기울이며, 일반인들이 생각하는 방향으로 반응했다고 할 수 있습니다.
NIM	부정적 인상	66	92.5	68	93.9	불편감을 과장하거나 문제를 왜곡하거나 도움을 요청하기 위해 의도적으로 부정적이게 반응하였을 가능성이 높습니다. 이 경우 임상척도 점수가 상승되지만 검사결과에서 의미가 있는 정도나 범위를 벗어날 가능성이 있으므로 구체적으로 질문하여 불편감이나 임상적 문제를 확인할 필요가 있습니다.
PIM	긍정적 인상	62	92.4	58	77.3	검사 상황에서 호의적 인상을 주려고 시도하지 않았다는 것을 의미합니다. 즉, 수검자가 긍정적인 인상을 심어주기 위해 반응을 왜곡했을 가능성은 낮다고 보여집니다.
SOM	신체적 호소	43	31.7	42	32.4	신체적으로 아무런 불편이 없다는 것을 의미합니다. 이 경우 대체로 낙천적인 경향이 있습니다.
ANX	불안	50	59.8	52	69.5	두려움이 없고 어떤 상황에서는 무모하게 행동할 정도로 신중하지 못한 경향이 있을 수 있습니다. 불안과 긴장을 거의 호소하지 않으며, 이 경우 침착하고 낙천적으로 스트레스를 효과적으로 처리할 수 있습니다.
ARD	불안관련 장애	59	82.4	64	89.8	다양한 상황에서 불편을 거의 경험하지 않는다는 것을 시사합니다. 이런 사람들은 대체로 정서적으로 안정되어 있고 잘 적응하고 있으며, 위기에 직면하더라도 침착하게 대응하는 경향이 있습니다.
DEP	우울	58	82.6	57	80.4	불행감이나 불편감에 대한 호소는 거의 없다고 보입니다. 정서적으로 안정되어 있어 자신감 있고 활동적이며 이완되어 있다고 할 수 있습니다.

결과해석

척도	척도명	일반 청소년 기준 적용		보호관찰대상자 기준 적용		일반적 해석
		T점수	백분위	T점수	백분위	
MAN	조증	52	66.3	53	69	조증 또는 경조증적 특징은 거의 찾아볼 수 없습니다. 이 경우 자신의 욕구나 생각을 잘 관리하는 편입니다.
PAR	망상	70	96.4	70	96	다른 사람을 공개적으로 의심하고 적대적으로 대할 가능성이 있습니다. 이 경우 가까운 사람들에 대해서도 불신하는 경향이 있고 친하게 지내는 사람이 거의 없을 수 있습니다.
SCZ	조현병	56	78.4	60	86.5	효율적인 사회적 관계를 형성, 유지할 수 있고 특별히 주의력이나 집중력에 장애가 없다는 것을 의미합니다.
BOR	경계선적 특징	50	59.9	50	57.8	정서적으로 안정되어 있고 안정적인 대인관계를 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
ANT	반사회적 특징	90	99.7	86	99.6	반사회적 성격장애의 특징들이 나타날 수 있습니다. 신뢰롭지 못하고 책임감이 없을 가능성이 높으며, 대인관계에서는 냉담하고 현실적 이득을 추구하며 욕구충족을 위해 다른 사람을 이용할 가능성도 높습니다. 충동적으로 현실적인 충족을 추구하거나 권위적 인물과 갈등을 경험한 적이 있을 수 있습니다.
ALC	알코올문제	46	82.5	36	12.9	보통 술을 마시긴 하더라도 술로 인한 문제는 거의 없다는 것을 의미합니다.
DRG	약물문제	48	92.4	46	81.4	약물을 거의 사용하지 않거나 전혀 사용하지 않는다는 것을 의미합니다.

결과해석

척도	척도명	일반 청소년 기준 적용		보호관찰대상자 기준 적용		일반적 해석
		T점수	백분위	T점수	백분위	
AGG	공격성	77	97.5	67	93	만성적으로 분노를 느끼고 분노와 적대감을 거리낌없이 표현할 수 있습니다. 분노 상황에 대한 파악을 위해 피검자의 응답을 검토할 필요가 있습니다.
SUI	자살관념	58	87	59	88.1	죽음이나 자살에 대한 생각은 거의 없고 있다고 하더라도 크게 문제시되는 범위는 아닙니다.
STR	스트레스	98	100	87	100	위기상황에 직면해 있다는 것을 시사합니다. 거의 모든 생활영역에서 혼란과 무력감을 느끼고, 고통을 야기하는 주변환경에 의해 희생당하고 있다고 생각할 수 있습니다. 이렇게 스트레스 수준이 높을 경우 다른 임상장애에 취약할 가능성이 높아지므로 스트레스 반응의 정확한 특징을 결정하기 위해 임상척도의 점수를 검토할 필요가 있습니다.
NON	비지지	81	99.4	74	99.3	생활에 중요한 사건들을 다루는 데 유용한 사회적 지지체계가 거의 없거나 또는 전혀 없다고 지각할 수 있습니다. 이 경우 자신을 도와주지 않고 거절할 것이라고 지각하고 있는 타인뿐만 아니라 자기 자신에 대해서도 매우 비판적일 수 있으며, 스트레스에 대해 매우 강하게 반응할 가능성도 높습니다.
RXR	치료거부	51	58.9	48	42.7	부분적으로 변화가 필요하다는 것을 인식하고 있습니다. 변화의 가능성에 대한 긍정적인 태도를 보이고 변화에 대한 책임의 중요성을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
DOM	지배성	61	89.6	61	87.7	사회적 상황에서 거의 불편을 느끼지 않고 자신이 통제할 수 있는 상황에서 다른 사람과의 상호작용을 선호합니다. 자기 스스로에게 만족감을 느끼고 자신감이 있으며, 타인을 설득하는 능력이 있습니다.
WRM	온정성	21	0.4	28	2.3	사회적 상호작용에 대해 거의 관심이 없고 친애욕구가 낮을 가능성이 있습니다. 내향적으로 위축되어 타인과의 관계욕구가 낮을 수 있습니다.

적합도 프로파일


	프로파일명	적합도
프로파일 1	119프로파일. 불안, 우울, 정서적 불안정성과 반사회적 특징이 동반되어 있는 내재화 프로파일 (이수정 등, 2019)	0.4
프로파일 2	10프로파일. 자살사고가 동반된 불편감이 심함 (Morey, 1991)	0.381
프로파일 3	33프로파일. 강간범 (Morey, 1991)	0.376
프로파일 4	6프로파일. 사회적 고립과 사고의 혼란 (Morey, 1991)	0.362
프로파일 5	106프로파일. 연인관계의 남성을 폭행한 경계선적 상태의 여성 (Chambers & Wilson, 2007)	0.349
프로파일 6	156프로파일. 기타 전쟁지역 참전군인, 외상후 스트레스장애 (Calhoun et al., 2010)	0.345
프로파일 7	24프로파일. 반사회적 성격장애 (Morey, 1991)	0.342
프로파일 8	104프로파일. PTSD, 이라크와 아프가니스탄 참전 군인 (Bellet et al., 2017)	0.342
프로파일 9	2프로파일. 우울하고 위축되어 있음 (Morey, 1991)	0.318
프로파일 10	32프로파일. 심리검사 당시 폭행범죄로 기소 (Morey, 1991)	0.305

· 적합도

: 프로파일과 실제 데이터의 통계적 유의성으로, 피검자의 데이터와 모형(프로파일)과의 유사성을 판별하여 적합도를 산출합니다.

· 22가지 상위척도 기준으로, 156개의 프로파일 중 적합도가 가장 높은 10가지 프로파일을 제공합니다. 결과해석에 참고하시기 바랍니다.

PAI-A의 기본적 해석전략



PAI-A 척도

척도		내용
타당성 척도	비일관성 (ICN)	수검자가 문항을 읽고 답하는 과정에서 일관성있게 반응하였는지를 알아보기 위해 정적 또는 부적 상관관이 높은 10개의 문항 쌍으로 구성되어 있음
	저빈도 (INF)	부주의하거나 무선적인 또는 매우 특이한 방식으로 반응하였는지를 알아보기 위한 척도. 문항 내용은 정신병적인 측면에서 중립적이고 대부분의 사람들이 극단적으로 인정하거나 인정하지 않는 문항들로 구성되어 있음
	부정적 인상 (NIM)	지나치게 나쁜 인상을 주거나 피병을 부리는 태도
	긍정적 인상 (PIM)	자신을 지나치게 좋게 보이려 하고 사소한 결점도 부인하려는 태도
임상 척도	신체적 호소 (SOM)	신체화장애, 전환장애와 관련이 있는 건강과 관련된 문제에 대한 집착과 신체적 불편감에 대한 호소
	불안 (ANX)	여러 가지 반응양식으로 나타나는 불안 경험과 불안의 객관적 징후
	불안관련 장애 (ARD)	강박장애, 공포증, 외상적 스트레스와 같은 구체적인 불안과 관련이 있는 증상과 행동
	우울 (DEP)	우울의 증상과 현상
	조증 (MAN)	조증과 경조증의 정서적, 인지적, 행동적 증상
	망상 (PAR)	망상장애와 망상적 성격장애의 증상
	조현병 (SCZ)	조현병에서 나타나는 광범위한 증상
	경계선적 특징 (BOR)	불안정하고 유동적인 대인관계, 충동성, 정서적 가변성과 불안정성, 통제할 수 없는 분노 등을 포함하는 경계선 성격장애의 특징
	반사회적 특징 (ANT)	범죄행위, 권위적 인물과의 갈등, 자기중심성, 공감과 성실성의 부족, 불안정, 감각추구 등과 같은 반사회적 성격장애의 특징
	알코올문제 (ALC)	문제시되는 음주와 알코올 의존적 특징
	약물문제 (DRG)	약물사용에 따른 문제와 약물의존적 특징
	공격성 (AGG)	분노, 적대감 및 공격성과 관련된 특징과 태도
치료 고려 척도	자살관념 (SUI)	무력감과 자살에 대한 일반적이고 모호한 생각과 자살에 관한 구체적인 계획
	스트레스 (STR)	일상생활에서 현재 또는 최근에 경험하는 스트레스
	비지지 (NON)	가용한 지지의 수준과 질을 포함하는 지각된 사회적 지지의 부족
	치료거부 (RXR)	심리적, 정서적 측면에서 자신의 문제에 대한 인식과 변화에 대한 동기
대인 관계 척도	지배성 (DOM)	대인관계에서 개인적 통제와 독립성을 유지하는 정도를 평가
	온정성 (WRM)	대인관계에서 지지적이고 공감적인 정도를 평가