

PAI-PS

단축

Personality Assessment Inventory - Prison Settings

교정용 성격평가 질문지

저자: Leslie C. Morey, Ph. D

한국판 표준화: 이수정 · 박은영 · 권해수 · 김영환 · 김지혜 · 박종규 · 오상우 · 이은호 · 조은경 · 황순택 · 홍상환

검사자

수검자명 SAMPLE

검사기관

성별

검사일 2019/11/07

만 나이 37 11 (1981/11/25)

재범 유무 ()

본 건 범죄 유형

수용전력 유무 (1)

본 건 범죄명

타당성 지표 결과

구분	척도	기준	해석	T점수
타당성 척도	비일관성 ICN	0-63	일관성 있는 반응	57
		64-72	비일관적	
		73 이상	매우 비일관적	
	저반도 INF	0-60	정상	70
		61-66	무선반응 의심	
		67 이상	무선반응	
	부정적 인상 NIM	0-64	정상	55
		65-69	부정적 인상 또는 도움요청	
		70 이상	부정적 인상 또는 정신병리 의심	
	긍정적 인상 PIM	0-35	정상 또는 도움요청	62
		36-57	정상	
		58-67	긍정적 인상 의심 또는 방어적 반응	
		68 이상	긍정적 인상	

문항 누락


Missing Items 0

수검자가 응답하지 않았거나 이중으로 응답한 문항의 개수입니다. 이러한 문항이 8개 이상일 경우 해석을 보류하고 문항에 대한 반응을 확인하거나 검토할 필요가 있습니다.

※ 타당도 지표의 해석

검사대상자가 어떠한 목적에서 자기자신을 잘 적응하거나 적응하지 못하는 사람 또는 매우 바람직하거나 바람직하지 못한 사람 처럼 위장하고; 자기자신에 대한 인식이나 통찰력이 부족하거나 자기기만하고; 정신적 혼란이나 부주의 또는 검사에 대한 무관심 때문에 검사결과가 왜곡될 수 있습니다. 따라서 이러한 경향을 찾아내기 위해 PAI의 4가지 타당성 척도 점수를 살펴봐야 합니다. 4가지 타당성 척도가 기준에서 벗어날 경우 검사대상자의 반응양식에 의해 검사결과가 왜곡되었을 가능성이 높습니다. 4가지 타당도 척도 중 하나의 결과가 상승하였을 때도 전반적인 타당도 척도의 변화를 고려하여 해석하는 것이 바람직합니다. 따라서 타당도 척도가 기준보다 상위점수일 경우, 프로파일을 해석하는데 많은 제한이 있으므로 다른 정보들을 통합해서 해석하는 것이 바람직합니다.


전체척도 프로파일



* — Clinical Skyline ; 임상환자의 평균에서 2표준편차 벗어난 값

ICN (비일관성, Inconsistency)	INF (저빈도, Infrequency)	NIM (부정적 인상, Negative Impression)
PIM (긍정적 인상, Positive Impression)	SOM (신체적 호소, Somatic Complaints)	ANX (불안, Anxiety)
ARD (불안관련 장애, Anxiety-Related Disorder)	DEP (우울, Depression)	MAN (조증, Mania)
PAR (망상, Paranoia)	SCZ (조현병, Schizophrenia)	BOR (경계선적 특징, Borderline Features)
ANT (반사회적 특징, Antisocial Feature)	ALC (알코올문제, Alcohol Problems)	DRG (약물문제, Drug Problems)
AGG (공격성, Aggression)	SUI (자살관념, Suicide Ideation)	STR (스트레스, Stress)
NON (비지지, Nonsupport)	RXR (치료거부, Treatment Rejection)	DOM (지배성, Dominance)
WRM (온정성, Warmth)		

전체척도 프로파일 결과



결과해석

척도	척도명	일반 성인 기준 적용		수형자 기준 적용		일반적 해석
		T점수	백분위	T점수	백분위	
ICN	비일관성	57	86.4	54	78.0	
INF	저빈도	70	96.2	59	90.1	가
NIM	부정적 인상	55	79.7	54	76.9	가
PIM	긍정적 인상	62	94.1	59	87.0	가
SOM	신체적 호소	65	92.6	62	89.2	가
ANX	불안	49	59.7	51	65.3	
ARD	불안관련 장애	38	12.4	41	22.0	
DEP	우울	51	62.3	50	59.4	

결과해석

척도	척도명	일반 성인 기준 적용		수형자 기준 적용		일반적 해석
		T점수	백분위	T점수	백분위	
MAN	조증	38	14.8	40	19.8	
PAR	망상	61	88.5	57	78.3	가
SCZ	조현병	52	69.6	53	76.5	
BOR	경계선적 특징	56	77.5	55	75.2	
ANT	반사회적 특징	62	90.2	58	84.6	가 가 가
ALC	알코올문제	66	92.3	59	82.9	
DRG	약물문제	72	97.5	47	85.1	가 가 가

결과해석

척도	척도명	일반 성인 기준 적용		수형자 기준 적용		일반적 해석
		T점수	백분위	T점수	백분위	
AGG	공격성	52	72.3	50	66.1	
SUI	자살관념	45	64.5	45	63.2	
STR	스트레스	49	60.8	46	47.4	가 ,
NON	비지지	75	99.6	68	97.4	.가 가 , 가
RXR	치료거부	61	91.0	62	92.7	가 가 가 가 PIM 가 가
DOM	지배성	48	52.0	46	41.0	
WRM	온정성	36	12.8	33	6.9	

적합도 프로파일


	프로파일명	적합도
프로파일 1	136 . 가 (, 2019)	0.663
프로파일 2	123 . PAI 0 (, 2019)	0.585
프로파일 3	138 . 가 (, 2019)	0.485
프로파일 4	135 . (, 2019)	0.464
프로파일 5	120 . , (, 2019)	0.428
프로파일 6	137 . (, 2019)	0.425
프로파일 7	139 . PAI-A (, 2019)	0.421
프로파일 8	116 . 가 / (27.3%), (23.8%), (11.9%) (, 2019)	0.408
프로파일 9	132 . (, 2019)	0.305
프로파일 10	38 . () (Morey, 2007)	0.3

· 적합도

: 프로파일과 실제 데이터의 통계적 유의성으로, 피검자의 데이터와 모형(프로파일)과의 유사성을 판별하여 적합도를 산출합니다.

· 22가지 상위척도 기준으로, 156개의 프로파일 중 적합도가 가장 높은 10가지 프로파일을 제공합니다. 결과해석에 참고하시 바랍니다.

PAI의 기본적 해석전략



PAI 척도

척도		내용
타당성 척도	비일관성 (ICN)	수검자가 문항을 읽고 답하는 과정에서 일관성있게 반응하였는지를 알아보기 위해 정적 또는 부적 상관성이 높은 10개의 문항 쌍으로 구성
	저빈도 (INF)	부주의하거나 무선적인 또는 매우 특이한 방식으로 반응하였는지를 알아보기 위한 척도. 문항 내용은 정신병적인 측면에서 중립적이고 대부분의 사람들이 극단적으로 인정하거나 인정하지 않는 문항들로 구성되어 있음
	부정적 인상 (NIM)	지나치게 나쁜 인상을 주거나 피병을 부리는 태도
	긍정적 인상 (PIM)	자신을 지나치게 좋게 보이려 하고 사소한 결점도 부인하려는 태도
임상 척도	신체적 호소 (SOM)	신체화장애, 전환장애와 관련이 있는 건강과 관련된 문제에 대한 집착과 신체적 불편감에 대한 호소
	불안 (ANX)	여러 가지 반응양식으로 나타나는 불안 경험과 불안의 객관적 징후
	불안관련 장애 (ARD)	강박장애, 공포증, 외상적 스트레스와 같은 구체적인 불안과 관련이 있는 증상과 행동
	우울 (DEP)	우울의 증상과 현상
	조증 (MAN)	조증과 경조증의 정서적, 인지적, 행동적 증상
	망상 (PAR)	망상장애와 망상적 성격장애의 증상
	조현병 (SCZ)	조현병에서 나타나는 광범위한 증상
	경계선적 특징 (BOR)	불안정하고 유동적인 대인관계, 충동성, 정서적 가변성과 불안정성, 통제할 수 없는 분노 등을 포함하는 경계선 성격장애의 특징
	반사회적 특징 (ANT)	범죄행위, 권위적 인물과의 갈등, 자기중심성, 공감과 성실성의 부족, 불안정, 감각추구 등과 같은 반사회적 성격장애의 특징
	알코올문제 (ALC)	문제시되는 음주와 알코올 의존적 특징
약물문제 (DRG)	약물사용에 따른 문제와 약물의존적 특징	
치료 고려 척도	공격성 (AGG)	분노, 적대감 및 공격성과 관련된 특징과 태도
	자살관념 (SUI)	무력감과 자살에 대한 일반적이고 모호한 생각과 자살에 관한 구체적인 계획
	스트레스 (STR)	일상생활에서 현재 또는 최근에 경험하는 스트레스
	비지지 (NON)	가용한 지지의 수준과 질을 포함하는 지각된 사회적 지지의 부족
	치료거부 (RXR)	심리적, 정서적 측면에서 자신의 문제에 대한 인식과 변화에 대한 동기
대인 관계 척도	지배성 (DOM)	대인관계에서 개인적 통제와 독립성을 유지하는 정도를 평가
	온정성 (WRM)	대인관계에서 지지적이고 공감적인 정도를 평가