

SCQ

Social Communication Questionnaire

사회적 의사소통 설문지 Lifetime 일생

저자 | Michael Rutter, M.D., F.R.S. Anthony Bailey, M.D.,
Sibel Kazak Berument, Ph.D., Catherine Lord, Ph.D., Andrew Pickles, Ph.D.

역자 | 유희정

검사자	sample	이름	sample
검사기관	sample	성별	
검사일	2022/07/22	생활연령	19 00 (2003/07/17)
응답자 이름	sample	대상자와의 관계	sample

SCQ 사회적 의사소통 설문지 소개


사회적 의사소통 설문지(Social Communication Questionnaire; SCQ)는 40개 문항으로 구성되어 있으며, 부모의 보고를 통해 자폐스펙트럼장애(Autism Spectrum Disorders; ASD)와 관련된 증상을 선별하는 도구입니다. SCQ의 문항들은 ADI-R의 문항들 중에서 진단에 중요한 의미를 가지는 문항들로 신중하게 선택하였습니다. SCQ는 비록 간결하지만 ADI-R과 마찬가지로 긴 면담을 요하며, 동일집단에 적용이 가능합니다.

구분	설명
SCQ: Lifetime(일생)	개인의 전반적인 발달력에 근거하여 답하는 것으로, 그 결과에 따라 더욱 정밀한 진단검사를 의뢰하는 데 적합함
SCQ: Current(현재)	최근 3개월 동안의 개인 행동을 바탕으로 작성되며, 그 결과는 매일의 생활 경험을 이해하고 치료와 교육계획을 평가하기에 적합함

SCQ는 평가 대상이 되는 사람의 발달력과 현재 행동에 대해 가장 잘 아는 일차 보호자가 작성해야 합니다. 평가대상은 정신연령 만 2.0세 이상부터 가능합니다. SCQ 작성에는 전문가의 도움이 필요 없지만, ASD를 진단하거나 치료하는 데 전문적인 수련을 받은 사람의 감독 하에 설문지를 사용하고 결과를 해석해야 합니다.

SCQ는 다소 특별한 발달을 하고 있는 사람들을 대상으로 검사하는 데 중요한 역할을 하며, 개개인의 행동 양상을 상세하게 묘사하기 위한 용도로 사용하는 것은 적절하지 않습니다.

SCQ 사회적 의사소통 설문지 결과



SCQ: Lifetime(일생) Form에서 절단점이 15점 또는 그 이상이 되면 ASD의 가능성이 있다고 여겨지며, 종합적인 평가가 필요합니다.

제시된 절단점은 위음성과 위양성 사이에서 절충되어 선택된 값입니다. 하지만 연구 결과, 15점이 최적의 절단점이라 할지라도 다른 위험요소(자폐증을 가진 형제, 심한 언어장애 등)가 있다면 포괄적인 평가를 위해 역치를 약간 낮추는 것이 바람직한 것으로 나타났습니다. 한국어판의 타당도 연구 결과는 10점 이상부터 주의 깊게 살필 것을 권하고 있습니다.

SCQ: Current(현재) Form의 점수는 발달이나 치료에 따른 변화 추이를 보는데 사용하는 점수로, 별도의 절단점을 제공하지 않습니다.